

しよれと

Palette

1

2023 January
vol.269















あけまして
おめでとう
ごあいさつ

新年のごあいさつ JA岡山ニュース総集編 2022

農を担う
野菜・米農家 小倉孝男 さん
円城地区……………10ページ

今月の折り込み 2023年1月号カタログショッピングチラシ ほか

JA 岡山ニュース 総集編 2022



組合員・利用者の皆さまにはお健やかに令和5年の新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、JA事業に格別のご理解とご協力を賜り、役職員一同心より感謝申し上げます。

さて、農業・JAを取り巻く環境は、農業就業人口の減少・高齢化、

て決議された「不斷の自己改革の
実践」として、基本目標である「農
業者の所得増大」、「農業生産の拡
大」、「地域の活性化」の実現にむ
けて、「営農振興計画」および「地
域ぐらし活性化計画」を新たに策
定し「J A 岡山中期計画」として
取りまとめました。関係機関と連

頭のごあいさつとさせていただきます。

宮武 博	経営管理委員会委員長	久山 英之	経営管理委員会副会長
藤澤 久	藤内 信	北村 孝	北村 孝
河内 孔	河内 孔	河内 孔	河内 孔
山岡 繁	山岡 繁	山岡 繁	山岡 繁
小森 健	小森 健	小森 健	小森 健
光森 正	光森 正	光森 正	光森 正
三宅 豪	三宅 豪	三宅 豪	三宅 豪
栗原 哲	栗原 哲	栗原 哲	栗原 哲
佐藤 雅	佐藤 雅	佐藤 雅	佐藤 雅
田口 明	田口 明	田口 明	田口 明
岡本 正	岡本 正	岡本 正	岡本 正
岡本 孝	岡本 孝	岡本 孝	岡本 孝
佐藤 雅	佐藤 雅	佐藤 雅	佐藤 雅
金居 俊	金居 俊	金居 俊	金居 俊
神宝 正	神宝 正	神宝 正	神宝 正
岡村 正	岡村 正	岡村 正	岡村 正
石井 謙	石井 謙	石井 謙	石井 謙
笹井 光	笹井 光	笹井 光	笹井 光
秋山 幸	秋山 幸	秋山 幸	秋山 幸
佐藤 守	佐藤 守	佐藤 守	佐藤 守





農業について思いを話す小倉さん

11月11日、円城地区の小倉孝男さんにお話を伺いました。

**兼業農家から
専業農家へ**

―就農したきっかけは―

我が家は昔から農家で子どものころから手伝いをしながら育ちました。勤めに出てからは兼業農家として、休日や勤務の前後に農作業をしていました。

専業農家になったきっかけは、あまり歳を重ねてからでは体力的に思い切ったことができないため、早期退職し、5年前に専業農家となりました。

―農業を始めてからは―

まず、父親から米の栽培を任せられました。自分で研究しながら毎年試行錯誤を繰り返して、大変でしたが成果が出たときは嬉しかったです。米栽培については、平成27年に集落で営農組合を立ち上げ、中心メンバーとして地域の田んぼを管理しています。今では多くの人から任せられるようになり、規模が広がっています。

現在は、米の他にキャベツ、白菜、かぼちゃを栽培しています。かぼちゃは、近年のハロウィンブームもあり、需要が高まっていることを感じます。作り始めたころは割に合わないと思うこともありましたが、管理の仕方も分かってきて頑張っ続けてよかったなと思います。

―楽しいことは―

野菜は手をかけてあげると、ちゃんと結果で返ってくるのでやりがいを感じます。機械を扱うのが好きで、トラクターを使っている土づくりは楽しいです。

―大変なことは―

ほ場が斜面のため、草刈りなどの管理作業が大変です。ただ、しっかり管理しないと病害虫が発生するため、苦勞を惜しまず取り組んでいます。

―栽培上でのこだわりは―

味はどこにも負けない自信があります。有機質の肥料を使い丁寧な管理を心がけ、消費者の方に「おいしい」と言ってもらえるよう日々努力しています。

**部会を立ち上げ、
地域を盛り上げたい**

―今後の抱負は―

秀品率を高め、収量を増やしながら、高品質なものを生産していきたいです。

また、現在かぼちゃには部会がありません。生産者と面積、収量を増やし、いずれは部会を立ち上げたいです。円城地区をかぼちゃの産地として認識してもらい、地域を盛り上げていきたいです。

聞き手…JA岡山広報担当



白菜の収穫の様子



かぼちゃ目揃え会で規格を確認する様子

高品質な生産に取り組み、 地域を盛り上げていきたい

小倉 孝男さん

円城地区：野菜・米農家

「おぐら たかお」

昭和39年生まれ。㊤加茂川秋冬野菜部会。キャベツ・白菜・かぼちゃ・米を経営。趣味はカラオケ。座右の銘は「初心忘るべからず」。



野菜

農薬は剤型により使用方法が異なります



営農部指導課 祇園 将人

農作物を安定して栽培・収穫するために農薬・肥料を使用します。今月は農薬について基本的なことを説明します。

●農薬の種類

農薬には主に殺虫剤・殺菌剤・除草剤・展着剤等があります。それぞれ目的によって選択します。剤型によって使用方法が異なります（資料1）。

●農薬使用前に

農薬には使用方法が記載されています（資料2）。表の例の農薬は、ナスのコナジラミ類、ゴボウのゾウムシ類に効果のある農薬です。希釈倍数はナスでは2000倍、ゴボウは1000倍と同じ農薬でも異なるものがあるので注意しましょう。次には10℃あたりの使用薬液・使用時期が記載されています。使用時期とい

花き

多種多様なツバキが春まで咲き続けます



営農部指導課 中川 雄一

冬から春は椿の花の季節！

日本海側に自生するユキツバキや中国地方にもたくさん自生するヤブツバキなどから約3000ともいわれる品種が作出されています。見られるほど楽しみがつきません。里山歩きでは、山路を彩る紅い落花に頭上のヤブツバキの存在を知ることもしばしば、身近な存在です。椿油も昔から使われてきました。

花言葉は「控えめな優しさ」「気どらない魅力」「誇り」などどこか日本的な印象です。


●生育特性など

日本に自生する植物ですから気候、土壌にも適し、比較的栽培しやすい花木です。通気性、排水性がよくなるよう土壌改良して植え付け準備をしましょう。できれば、大きく生長した後も排水のよい好適な環境が確保できる場所を選定することが理想です。日向でも日陰でも栽培できますが、西日をできるだけ避け、日陰でも明るいところに行きましょう。


●品種の例

花の咲き方だけでも、一重、八重、千重、牡丹咲、獅子咲さらに覆輪絞、大小など様々な分類されます（資料3）。


資料3 品種の例



ヤブツバキ系
紅一重大輪品種



岩根絞




小輪多花性の
ロゼフローラ

資料4 胡蝶侘助の自然実生から咲いた花（極小輪で白星が少ない）




資料5 種子の直根先端切り



2～3cm伸びた根の先を切って植え付けると細根がよく出て生育しやすくなります

資料6 胡蝶侘助の芽（11月には立派になっています）



左右の丸いのが花芽、中央の細いのが葉芽。樹勢回復や、株の早期養成を目指すときは花芽だけ摘む

●農薬の散布について

農薬の散布は朝露などで濡れていなくて風のない時間帯に行うようにしましょう。風のある時に散布し、間違えて周辺の他の作物に飛散してしまうと、その作物は場合によると「無登録農薬を散布した作物」ということで収穫・出荷が出来なくなりま

す。風がない場合でも細心の注意を払って散布します。また、夏場など屋の高温時に散布すると農薬が虫眼鏡レンズのような役割となり、葉が

やけるなどの薬害が発生する場合がある。高温時の散布も避けてください。散布中に農薬が余っても、1度散布して乾いたところに再び散布すると2度掛けとなり、薬害が起る恐れがあるので注意してください。農薬は、同じ農薬を続けて使用すると抵抗性ができ、だんだん効果が劣っていきます。他の薬剤と順番を決めて輪番で使いましょう。また、

資料1 農薬の剤型

種類	剤型	使用方法
水和剤・顆粒水溶剤・ドライフロアブル等	粉末	希釈して使用
乳剤・液剤・フロアブル等	液体	希釈して使用
粒剤・粉剤・微粒剤	粒・粉	そのまま散布
ペースト剤	ペースト状	そのまま塗布

資料2 農薬適用と使用法（例）

作物名	適用病害虫	希釈倍数	10aあたり使用液量	使用時期（収穫前）	本剤の使用回数	使用方法	○×○×を含む農薬の総使用回数
ナス	コナジラミ類	2000倍	100～300ℓ	前日まで	2回以内	散布	2回以内
ゴボウ	ゾウムシ類	1000倍		7日前まで	4回以内		4回以内

農薬散布は、病害虫の発生初期に薬剤の散布ムラがないように丁寧に散布するのが一番です。農薬を安全に使用し、よい野菜を安定収穫していきましょう。

- ①玉之浦…紅花に見事な白覆輪の春咲きヤブツバキです。長崎県五島の山林で1947年に発見されました。
- ②岩根絞…八重咲大輪の濃紅地に白い雲状斑が入る遅咲き品種です。発色にはいくらか変異があり、木はあまり生長しません。
- ③太郎冠者…薄ピンクの一重猪口咲き中輪、長期咲で香があります。室町後期からの茶花とされます。
- ④胡蝶侘助…一重猪口咲きの極小輪で、紅色に白星が入ります。1600年代に記録がある古い品種で、木の生長はゆっくりしています。

生長の早さ、木の大小などかなり品種差がありますから、植物園や店頭でよく見て植える場所や目的に合った品種を選びましょう。

●植え付け

花後の3月中旬～4月中旬、梅雨期、9月中旬～10月下旬が適期です。梅雨明けの酷暑期は小苗では半日陰にして保護する必要があります。春、秋の早い時期がおすすです。植え付け場所の土づくりができた後、根巻き苗はそのまま、鉢苗は一回り根鉢をほぐしてから植えるのが基本ですが、鉢苗でも底にごろ石を入れていたり、根詰まり気味になっていたりしなければそのまま植え付け可能です（そうでなければほぐして植えましょう）。ここでは交配、播種について説明します。せん定などの解説を2018年1、2月号に掲載しています。

●交配

ツバキは他花受粉性が強く、自然に結実した種を播いても違った花が生まれるのが楽しみですが、より大輪にか、気に入った花の色違いをか目標を持って交配してみたいか、が得意（資料4）。寒いところでは厳寒期は交配後の子房が寒害に遭う心配があるようなので、遅咲き品種から挑戦しましょう（播種から開花までは4～5年以上かかります）。

①結実させようと思う品種の花が蕾のうちに花弁とおしべを取り除きます。

- ②もう一方の品種の花粉をめしべの柱頭にこすりつけます。
- ③受粉後の花に紙袋をかけた後、柱頭を覆うようにセロテープを付けたりして、他の花粉が着くのを防ぎます。茎に交配親品種を書いた札を付けます。
- ④9月ごろ実が裂開するので、種を失わないよう網などをかけておきます。乾燥してしまつと発芽しなくなるので、すぐに播きます。

◎簡易な方法

種をよく洗い、流水で数日吸水させます。水苔を吸水させ固く絞ったものをポリ袋に入れ、これに種を混ぜて口を縛り、3ヶ月程発根するのを待ちます。

⑤新しい小粒赤玉土にこの種を植え付け、土が凍結しないように越冬、最初の夏は半日陰で苗養成します。植え付け1年半ごろから液肥を与え始めます。

◎種の植え付け

根の先端を切った方が細根がよく出て生育がよくなります（資料5）。☆栽培中の株が弱ると花芽が多くなる傾向です。そんなときや、早期株養成したいときは摘蕾しましょう（資料6）。

果樹

整枝・せん定
について紹介
します



営農部指導課
武田 祐一

今月は桃を植え付けてからの整枝・せん定について紹介しますので参考にしてください。

●桃のせん定

開心自然形は従来から行われている整枝法で、2〜3本主枝が一般的です。最近では、3本主枝はなかなか均等に120度ずつ主枝が取りにくいいため、2本主枝が主流となっています。ここでは2本主枝整枝法を説明します。

苗木の植え付け時には、接ぎ木部から30センチ程度の葉芽の上で切り返し、苗木が風で揺れないよう支柱に誘引します。植え付け1年目のせん定時には切り返しをした所の葉芽が最も強く伸び、第2主枝として利用するのですが、乾燥や芽欠けにより下部より発生した新梢の方が強勢に伸びる場合があります。そのようなときはそれを第2主枝として使います（第2主枝発生部位より上の発生枝は切ります）。

次に第2主枝から発生している副梢で地上部から40〜60センチから発生している副梢を第1主枝として使います。その他の新梢はかき取るかねん枝をしておきます。注意することは、第2主枝誘引方向の180度反対側の新梢を選ぶことです（うまく整枝するには20〜30センチ伸長した5月中旬ごろに

60〜90度になるよう竹などで誘引しておく）と整枝がうまくできます）。
第1主枝、第2主枝の切り返しは充実した所（表皮が赤色から茶色になった境）の下の外芽の直上まで切り返します。第1垂主枝候補は主枝の分岐位置から80センチ程度離れた位置で、斜め下方に発生した副梢を選出し、主枝に対して上から見ると60度程度開き、横から見ると主枝に対して30度程度開きます（成木になって水平以上に開く場合は枝の吊り上げや支え棒等を使います）（資料7）。

●キウイフルーツ

キウイフルーツの木は、雌雄異株です。実をつけるためには、雄木と雌木を最低でもそれぞれ1本ずつ必要です。キウイフルーツのせん定時期は、12月〜2月が休眠期です。シーズンが過ぎて春になってから枝を切ると樹液が溢れ出ます。樹液は出て問題はありませんが、樹勢が弱まる原因になりますので、早めにせん定しましょう。放置すればグングン伸びるので、せん定は必ず必要な作業となります。

キウイフルーツのせん定の仕方とポイントを解説します。安定しておいしい実をつけるためにも、せん定を行いましょう。


○徒長枝などの不要な枝を切る

細く長く伸びてしまった徒長枝のほか、弱々しい枝・枯れた枝・病気になる不要な枝は切りましょう。密集している場所の枝も切って、風通しをよくします。そうすることで、元気な枝の成長を促します。日当たりもよくなるため、病気や害虫の予防にも繋がります。


棚から上に伸びた枝（太く伸びた徒

長枝）を切りましょう。古い枝には実をつけません。昨年実をつけた枝や増えすぎた枝は切りましょう。どんどん伸びて増えるので、切りすぎたかな？と思うくらいでちょうどいいです。
棚仕立ての場合は、棚の高さまで主幹を伸ばし、棚に到達したら水平に倒して左右に誘引します（資料8）。上向きを倒すことで花芽がつきやすくなります。
その年に果実をつけた枝の、果実がついた節（成りエボ）からは発芽しないので、その節から先の3〜5節を残して結果枝節とし、枝の先端は


資料7 植え付け1年目のせん定（2本主枝整枝）



資料8 キウイの栽培方法



資料9 結果習性





ノートルダム清心女子大学 食品栄養学科 学生考案レシピ



岡山県産野菜をたっぷり
使用したキンパ風おにぎり！

材料 (3個分)

ご飯…………… 1合
卵 Lサイズ …… 1個
牛こま切れ肉 …… 40g
れんこん………… 35g
にんじん………… 25g
黄ニラ…………… 10g
焼き海苔………… 1枚
炒りごま
… 小さじ1弱 (または小さじ 2/3)

<調味料>

酒 …………… 小さじ2弱
濃口醤油 …… 小さじ1
トウバンジャン …… 小さじ1
にんにく (すりおろし)
…………… 小さじ1弱
ごま油…………… 小さじ1
砂糖 (A) …… 少々
砂糖 …………… 小さじ1
塩 …………… 少々

- ① れんこんは半月切りにして水にさらし、にんじんは皮をむいて千切り、黄ニラは3~4cmのざく切りにする。
- ② 卵に砂糖 (A)、塩を加えよく混ぜる。中火で炒り卵にする。
- ③ フライパンにごま油をひき、牛肉、にんじん、れんこん、黄ニラの順に入れて火が通るまで炒める。
- ④ 残りの調味料を加えて水分が飛ぶまで中火で炒める。
- ⑤ ボウルに②、④、いりごまを入れて混ぜ、三角型に握る。

Point!

岡山県産の食材を多く使用し、野菜や肉が入ったおにぎりにしました。キンパの具材では珍しい黄ニラやれんこんを使用し、香りや歯応えも楽しめるように工夫しました。甘辛のタレを使用しているため、子どもから大人までさまざまな世代に好まれるおにぎりです。



上寺山 餘慶寺

今回のあぐろグラムでは、瀬戸内市邑久町北島にある「上寺山 餘慶寺」について紹介いたします。餘慶寺は、天平勝宝元年(749年)に報恩大師によって開山された1250年以上の歴史があるお寺です。かつては7院13坊の塔頭を数え、今日でも恵亮院等、6僧院があります。豊原北島神社が隣接しており、平安時代に発展した神仏習合の形態を今に留めています。

また、12月30日、31日には境内のライトアップが予定されておりますので、幻想的な景色を楽しんでみてはいかがでしょうか。

編集担当 久山 隆一



各種媒体で情報発信



オンラインショップ
はなやか
オンライン



Instagram



Twitter



YouTube

