

ぱれっと



12

2024 December

vol.292

スマート農業の取り組み ザルビオ フィールドマネージャー

農を担う
梨農家 岡本 真典 さん
雄神地区……16ページ

今月の折り込み 2024年12月号カタログショッピングチラシ ほか

ザルビオでできること

●地力マップ・生育マップ



地力が低い・生育の悪い
場所が一目で分かる

●天気予報・散布天気予報



作業に適した天候の
日時が把握できる

●生育ステージ予測



生育に合わせて的確な
作業を計画できる

●病害アラート



病害発生リスクを
事前に察知できる

●可変施肥&可変散布マップ



ドローン撮影なしで
可変施肥マップを作成できる

初級者向け機能について

衛星画像をAI解析したマップ機能で地力ムラや生育ムラなどのほ場の状況を真上から見ることができ、農家の「目(確認)」をサポートします。

■**生育マップ** ▶ 葉面積指数 (LAI) に基づいてほ場内の生育状況をマップで表示します。
葉面積指数 (LAI) とは、地表面積に対する葉の面積の割合を示す指数です。



ほ場内での生育ムラや、 日々の生育の変化が確認できる

生育状況をPCやスマホのアプリから確認できるので、一つ一つのほ場をまわり、生育調査していた時間を削減しつつ、適切な追肥判断、追肥量の調整が可能になります。

●特別な操作は必要なし

過去の日付を含む作期中の衛星画像をAI解析し、マップが自動で更新されます。※作物によって遮れる期間は異なります

●簡単に生育状況を確認できる

ほ場に雲がかかった日を除いて、毎日更新。効率的にほ場の生育状況が把握できます。

●追肥判断に活用

ほ場内の生育ムラを確認して施肥量の調整(可変施肥)することで、収量アップを実現できます。

スマート農業の取り組み

ザルビオ フィールドマネージャー

JA岡山では、令和6年度事業計画に基づき2024年4月から、水稻での栽培管理支援システム「ザルビオ フィールドマネージャー (以下「ザルビオ」)」の試験運用を進めています。今回の特集では、そのシステムについてご紹介いたします。

ザルビオとは？

スマート農業の実践に向けて、人工知能 (AI) と人工衛星から取得する画像解析データ等の活用により、作物の生育状況やほ場地力の画像診断、生育予測や病害予測による最適な防除や収穫適期等を判断できます。

JA岡山では

水稻の収量・品質の向上を目指し、生育状況に応じた営農指導を実践するため、ザルビオによる画像解析データを活用しています。

■具体的な活用例

- ①病害発生リスク予測による防除指導
- ②生育マップを活用した生育状況の分析
- ③生育ステージ予測による出穂期・収穫期等の情報発信
- ④地力マップを活用したほ場の情報提供



JA岡山と連携して一緒に取り組みませんか。

その他中級者向けの機能では、AIが生育ステージや病害リスクを予測。防除や施肥、水管理のお知らせで農家の「頭（判断）」をサポート。上級者向け機能では、スマート農機と連携した可変施肥・可変散布の実現で、作業効率を図り農家の「手（作業）」をサポートします。

料金プランについて

低コストで始められるスマート農業。

（年額料金）

登録圃場面積	初級者向けプラン	中級者向けプラン
2haまで	13,200円	13,200円
3ha	13,750円	14,300円
4ha	14,300円	15,400円
5ha	14,850円	16,500円
10ha	17,600円	22,000円
20ha	23,100円	33,000円
30ha	28,600円	44,000円
40ha	34,100円	55,000円
50ha	39,600円	66,000円
100ha	67,100円	121,000円

■初級者向け機能

- ▶ 生育マップ
- ▶ 地力マップ
- ▶ 散布天気
- ▶ 平均植生 (NDVI) マップ

■中級者向け機能

- ▶ 生育ステージ予測
- ▶ 病害防除推奨アラート
- ▶ 雑草管理プログラム

説明会を開催します！

導入方法、各プラン申し込み、利用開始方法について

■開催時期

令和7年1月下旬ごろ

希望者へは、開催前に案内をお送りします。
お気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ

最寄りの営農センターまたは
営農部 指導課
TEL:086-225-3224



■地力マップ ▶ 過去の衛星画像から生育の傾向をAI解析し、地力を可視化したマップです。



ほ場の地力ムラを可視化!

ほ場内の施肥量の調整(可変施肥)を簡単に実現


地力マップを見るだけで、ほ場の中で例年どの場所が収量が良く、どの場所が悪いのかを把握できます。地力マップを使い、施肥量の調整(可変施肥)を行うことで、収量アップや肥料コスト削減を実現できます。

農家様事例

収穫時のムラとザルビオの地力がほぼ一致

2021年に水稻栽培でザルビオを活用いただいた、ある農家様のデータでは、実際にコンバインで計測した収量マップと、地力マップが示す地力は、ほぼ同じ傾向を示しています。

実際の
収量マップの
データ



地力マップが
示す地力

● ほ場と作物を登録するだけ

簡単な操作でほ場の過去の衛星画像を解析し、自動でマップを生成します。

● 簡単に地力ムラを確認できる

地力が高い場所、低い場所を緑色の5つの濃淡でゾーン分けし表示します。

● 詳細な施肥管理に役立つ

土壌分析するべき場所を特定できるため詳細な施肥管理に役立ちます。

■散布天気 ▶ 1時間ごとの降水確率や風速をAIが解析し、散布作業に最適な時間帯を色でお知らせします。



● 最適な時間帯を色でお知らせ

散布に適した時間帯を1時間ごとに表示。
最適な作業タイミングが分かります。

● 最大9日先まで予測

PCでは9日先までお知らせします。

ドリフト※リスクや降雨を避けて 肥料・農薬散布ができる

肥料や農薬散布を行う際に、どの時間帯に作業を行えば、ドリフトリスクや降雨の影響が少ないかを判断するのに役立ちます。

※ドリフト…農薬飛散

■平均植生(NDVI)マップ

- ▶ ほ場の植生状況を正規化植生指数 (NDVI) で色分けしたマップです。



農場全体の中で生育が遅れているほ場が分かる

● 作業の優先順位づけに

複数のほ場を俯瞰しながら、植生の旺盛度を確認。
作業の優先度を判断することができます。

■その他のマップ



雑草マップ

作付け前のほ場の雑草発生状況を分類表示したマップです。



標高・斜面マップ

国内各地の実測データを基に、ほ場の標高および斜面、斜面+標高をシミュレーションし、算出したマップです。




土壌マップ


農研機構 (NARO) および国際土壌照合情報センター (ISRIC) が公開している土壌データに基づいたマップです。

●**白菜について**
白菜は暑さに弱く、冷涼な気候を好む野菜ですが、秋まきで年明け収穫のものは球先が霜害を受け傷む場合があります。12月上中旬に白菜の頭を外葉ごとまとめてひもでしばりましょう(資料1)。そうすることで寒さによく耐え、畑に長く置くことができます。


資料1 白菜の防寒



資料2 ブロッコリー・カリフラワーの花蕾の保護



資料3 エンドウの防寒



資料4 タマネギに使用できる殺菌剤(例)

農薬名	対象病害	倍率	使用時期(収穫前)	総使用回数
シグナムWDG	べと病・灰色かび病 白色疫病・灰色腐敗病	1500倍	7日前まで	3回以内
ジマンダイセン水和剤	べと病・灰色かび病 白色疫病・灰色腐敗病	400~500倍	3日前まで	5回以内
プロボース顆粒水和剤	べと病・灰色かび病 白色疫病	1000倍	7日前まで	3回以内
ランマンフロアブル	べと病・白色疫病	2000倍	7日前まで	4回以内

●**冬季の野菜の防寒対策について**
12月になり、冬の冷え込みが本格的になってきたころかと思えます。畑の野菜も寒さに弱いものがあるので、防寒対策を行いましょ。また、冬季のタマネギの管理についても記述します。



営農指導課 祇園 将人

野菜(冬季野菜)

楽しい家庭園芸

2024.12
お問い合わせ先
営農指導課
Tel.086(225)3224

●**エンドウについて**
先月記述したエンドウは、苗が小さければ耐寒性には優れますが、大きくなると防寒対策が必要です。12月中下旬に株元に堆肥やわらを敷いたり、早めに支柱を立てて地上部約40センチくらいにヒモを張り、わらを垂らすなどして防寒しましょう(資料3)。

●**タマネギの当面の管理について**
肥料については、基肥で一発肥を使用しない場合には追肥を行います。極早生・早生・中生種では12月、2月に追肥を行います。毎回10平方メートルあたり約400gの追肥をしますが、毎回葉色等を確認して肥料の量を調整します。肥料を多く施用しすぎるとべと病等の原因となり、遅い時期の追肥は、貯蔵中の早期腐敗の原因になるので注意してください。また、マルチをしていない場合には追肥の際に土を軽く混和し、除草を行いましょ。

●**タマネギの栽培に多くみられるのはべと病です。べと病は温暖多雨になると発病しやすくなります。冬も発病しますが、春の長雨で発病が助長されるので注意が必要です。**
防除の時期は12月中下旬、暖かくなり始めた3月上旬に行い、それ以降は2週間おきに天気を見ながら行います。まず、年内に畑で越冬病菌がないよう防除します。1、2月は畑を確認し、耕種的防除としてべと病が発生している株を抜き取り廃棄します。また、4月になるとタマネギの主要害虫のアザミウマ等が発生するので4月以降の防除には殺虫剤を混用しましょ。

べと病の防除は色々な薬剤がありますが、同じ薬剤を何度も続けて使わず、順番に使用するのが効果的です。1例ですが、資料4を参考に、総使用回数や収穫前日数を間違わないようにローテーション散布を行いましょ。

JA岡山からのお知らせ

JA OKAYAMA

第2回農業経営応援セミナー開催のご案内

適正な確定申告を行うためのポイントをわかりやすく紹介します。また、農協ソリマチWeb記帳業務支援システムを活用した決算入力操作や申告書作成の留意点を紹介します。

参加費
無料

開催日時・会場

令和6年12月18日(水)
①9:30~12:00
JA岡山 津高支所 2階大会議室
(岡山市北区栢谷1057)
②14:00~16:30
JA岡山 西大寺支所 3階大ホール
(岡山市東区西大寺中野377-1)

内 容

- (1) 農協ソリマチWeb記帳業務支援システムの活用について
～決算書や申告書をらくらく作成 スムーズな確定申告をサポート～
講師: JA岡山中央会 JA支援部 担い手サポートセンター、
(株)ソリマチA&I営業本部 神田 良和 氏
- (2) 令和6年分の確定申告に向けた留意事項について
～適正な申告と正しい知識で、節税と農業経営の基盤づくりへ～
講師: 全国農業協同組合中央会所属 税理士 栗山 賢陽 氏
- (3) その他情報提供

対 象 者

JA岡山組合員

申込方法・期日

JA岡山支所・営農センターへ「農業経営応援セミナー参加申込書」を設置しておりますので、「申込書」へご記入のうえ、最寄りのJA岡山支所・営農センターへ提出ください。

申込期日: 令和6年12月9日(月)

お問い合わせ先

【農協ソリマチWeb記帳業務支援システムに関すること】
JA岡山企画部 企画課 TEL.086-225-9845

【その他セミナーに関すること】
JA岡山営農部 指導課 TEL.086-225-3224
JA岡山中央会担い手サポートセンター TEL.086-232-2364

株式会社JA岡山
農機センターからのお知らせ

JAグループ 岡山農機フェア2024

場所 岡山市北区高松稲荷 最上稲荷駐車場
日時 12月6日(金)・7日(土)
9:00~15:00

お気軽にお誘いあわせの上ご来場ください

※会場内受付にて、「来場者名簿」へ氏名、連絡先をご記入ください。

年末年始休業日のご案内

オートパル・中古車センター・農機センター

【年末年始の休業日】

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)

ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

株式会社JA岡山
生活事業部からのお知らせ

お葬式の疑問「事前相談」で 解消しませんか？

相談無料、まずはお気軽にお電話ください。

やすらぎ東会館

岡山市東区西大寺中野377-6 TEL (086) 944-2800

ホームページにはご葬儀や各種イベントに関する情報を多彩に掲載しております。また、ホームページからの資料請求も受け付けております。皆さまのアクセスをお待ちしております！

【URL】<https://sougi.ja-okayama.or.jp/>
(JA公式サイトからもアクセス可能です)

来場者には
エンディングノートを
プレゼント！

墓石、仏壇・仏具、
ギフトのご用命もJAへ！

生活事業部
TEL (086) 944-0048



花き（セントポーリア）

一年中花咲く
箱入りむすめ



営農部指導課
中川 雄一

●**小ぶりな鉢物で人気のセントポーリア**
花屋さんの店頭で、カラフルでかわいい花が目が留まり、どれにしようかと目移りしている間に3鉢ほど買ってしまった・そんな、魅力的で、置き場所も取らないセントポーリアは、イワタバコ科の宿根草。ちよつと個性的な鉢花の特性を知って、長く花を楽しみましょう。

●原産と名前の由来など

現在のセントポーリアには多様な品種がありますが、歴史は浅く、1982年にアフリカ、タンザニアの高地で発見され、名前は発見者名から付けられました。

花言葉は「小さな愛」「親しみ深い」「深窓の美女」などで、暗いイメージのものが無いので贈り物にも適しています。大まかに3つのタイプがあり、一般的なスタンダード種のほか、コンパクトな株に可憐な花を多数つけるミニチュア種、脇芽がたくさん出てこんもりした姿になるトレイル種、そしてそれぞれにさまざまな花色や花形があります（資料5）。

●生育特性と環境

原産地からも想像できるように、低温には弱く、高温になりすぎると苦手で、生育適温は、18℃～25℃です。冬は保温し、夏はできるだけ涼しく

く管理するようにしましょう。本格的に取り組む場合はセントポーリア育成用のケースもあるようですが、一般的には冬は、特に夜の保温に努め、夏は半日陰の風通しのよいところに置くか、理想的には冷房の効いた部屋で管理することです。

最適な湿度は50～60%、空気の乾燥する時期には乾きすぎないように、冬はエアコンの風などが直接当たらないように気を付けましょう。

気温や湿度については、人が快適に過ごせる環境が適します。


光線については、直射光は避け、比較的明るい室内が適します。冬はレースのカーテン越しのやわらかい日差しが良いとよく言われます。

●日頃の管理


置き場所は前記の環境を目標にして選びます。

水やりについては、土の乾く速さが気温や日当たりによって違いますが、3～7日に一度くらいで、鉢底から出るまで充分灌水します。

資料5 スタンダード種とミニチュア種の例



資料6 セントポーリアの水やり



やるときはたっぷり、冷水を避け、葉にかけないようにしましょう

できるだけ葉に水をかけないように、特に寒い時期は水をあらかじめ汲み置いて、冷たい水をかけないようにしましょう（資料6）。

ダニ対策として、時々（冬は暖かい日中）、花を避けて葉を洗うように水をかけてやりま。

脇芽が葉のわきに出てくるので、トレイル種以外は早めに取り除きましょう。

肥料切れすると花付きが悪くなるので、4～10月の間、盛夏期以外は、薄い液肥を月2回程度施します。


●植え替え

時期は春（4～5月ごろ）か秋（9～11月ごろ）のできるだけ花の少ない時にします。

用土は排水・保水ともによく、軽い土が適します。セントポーリア用培土を購入するか、小粒赤玉土とバーミキュライト、ビーナスライト（黒曜石を焼成したもの）などを混合して通気の良い用土に調整します。

①鉢底に小粒の軽石、珪酸塩白土など

資料7 葉挿しと鉢上げ



●病害対策

しおれた花をそのままにすると灰色かび病が発生します。早めにとり除きましょう。

を入れ、②株を鉢から抜き取り、根を広げて傷んだ部分を切り取ります。③新しい鉢に株を入れ、準備した用土を鉢縁の約2cm下まで入れます。④用土には少量の緩効性化成肥料を混ぜておき、植え終わった後、たっぷりの水やりをします。この時、株分け可能ななら、根を切らないように1芽ずつ株分けして植え替えます。

●葉挿し

4～6月ごろ、中間くらいの若く元気な葉を選び、葉柄が2cmほどになるように切って、バーミキュライトなどに葉柄が埋まる程度に斜めに挿します。この時、葉の面が南向きになるようにします。2カ月くらいで芽が出て、4～5カ月後には鉢上げできます（資料7）。

果樹（果樹のせん定）

果樹はある程度寒さに合わせましょう



営農部指導課
武田 祐一

今年も師走の12月がやってきました。果樹は落葉後にある程度、寒さに合わせてからせん定を行うことが大切です。せん定した時に切り口から樹液がにじむような場合は、せん定時期が早いので遅らせてあげましょう。

●果樹のせん定時期と目的

落葉果樹は、12月からせん定の時期に入ります。せん定時期は果樹の品目により多少異なります。一般的には発芽の早い梅は年内～1月中旬に行います。発芽の遅い西洋イチジクは寒さの和らいぐ3月に入ってから行います。せん定の目的は着果量を制限して毎年コンスタントに果実を結実させることが

大きな目的となります。もう一つは樹勢を維持し、作業しやすい樹形にすることです。後は品目の結果習性（花芽・葉芽等のつき方）に基づいたせん定で結果の安定と着果量の調節を行い、大きくておいしい果実を生産しましょう。

●果樹の整枝・せん定


整枝・せん定をしないで自然に枝を伸ばすと、樹形が乱れるうえに枝が込みあって日陰になった枝が枯れたり、果実の甘味や結果が悪くなったり、防除の散布ムラおよび病害虫の発生源や摘果・袋掛け・収穫等の作業管理が困難になるなど樹の維持管理が難しくなります。そうなる前に樹を開心自然形や杯状形などに開かせたり、凹凸をつけるように整枝・せん定を行い、樹冠内部まで日光が入るようにして、安定したおいしい果実を生産しましょう（資料8）。

●せん定の注意（資料9）

①車枝（同じ勢力の三又は真ん中が弱る）や重なり枝、平行枝、徒長枝、内向枝などを確認し、状態に応じてせん定していきます。


②側枝が下垂したら、適度な横向きの位

資料8 樹表面の凹凸で日当りをよく




資料9 せん定の注意

○車枝 ○重なり枝



資料10 切り返しせん定と間引きせん定

芽の種類と結果枝の分類



資料11 品目別の花芽と葉芽の付き方

品目	芽の形態	花芽の着生部位	果実の着生枝	よく結実する枝（果枝）	陰芽の発生	樹の姿
モモ	花芽、葉芽が分かれる	前年枝の頂芽と腋芽	前年枝	中、短	少	開
スモモ				短、花束状短果枝	多	開直
黄桃				長、中、短	中、少	直
日本梨	花芽と葉芽が1芽に混在	頂芽と腋芽	当年枝	長、中、短	中、多	直
西洋梨		頂芽		中、短	中	直
リンゴ		腋芽		—	少	蔓
ブドウ		頂芽と頂芽に続く2～3の腋芽		中、長	多	直～開
柿		基部3～8節の腋芽		長	中	蔓
キウイ		柿と同じ		中、長	中、多	開
栗		頂芽、腋芽		1.5m程度	—	開
イチジク						

注:短は10cm以下、中は10～30cm、長は30～50cm

③太くなった枝や利用できない徒長枝は根元から切りましょう。

●**切り返しせん定と間引きせん定**
せん定は切り返しせん定と間引きせん定を組み合わせて行います。樹に勢いをつけたい時は枝の途中で切る方法の切り返しせん定をして、逆に樹を落ち着かせたい時は枝を根元から切る方法の間引きせん定をします（資料10）。

●**結果習性**
モモ・スモモ・梅などの核果類は複合芽で前年枝に花芽と葉芽が分かれて着き、花芽の位置が容易に確認できます。しかし、柿・梨・ブドウ・キウイ・栗・柑橘類などは混合芽なので、前年枝に花芽と葉芽が1芽の中に混在し、枝が伸長した当年枝にならないと花芽が確認できません。また、混合芽は果樹の種

●カイガラムシ類の防除について

柑橘類やモモなどについては、カイガラムシ類が付着して幹が白くなっていることがあります。モモなどの落葉果樹では機械油乳剤95の20倍液を散布して翌年の発生源を減少させましょう。ただし、弱った樹では枯れる場合があるので、ワイヤーブラシで剥がす方をおすすめします。ミカンなどの柑橘類の常緑果樹（落葉しない果樹）は収穫した後に機械油乳剤95の45倍液（冬期）で散布します。

1月号は整枝等について記述いたします。

これからますます寒さの厳しい季節になると思いますので、体調管理には注意してください。



営農センター職員と、成育状況を話す岡本さん

雄神地区は、明治の終わり頃に梨の栽培が始まり、我が家でもその時から梨やブドウを代々作っていました。

私は、大阪でコンピューター関係の仕事をしていましたが、15年前に父が病気をして入院することになり、明治の時代から続いている梨農家を「ここで終わりにしたくない」という気持ちで強くあったので岡山に

―就農したきっかけは

梨農家、私で五代目

10月4日、雄神地区の岡本真典さんにお話を伺いました。

帰り、農業をすることに決めました。

―農業を始めてからは

就農した時は、60坪のほ場に新高梨やあたご梨、ヤーリー（鴨梨）がありました。小学校の時から、授粉や袋掛け、収穫など忙しい時期に手伝っていました。それ以外の作業については、何も知らない状態でした。

基本的なことは、父から教わりましたが、その他に栽培講習会にも参加して自分で調べたり試行錯誤しました。ほ場によって環境が違うので、一番合ったやり方を見つけようと、いつも努力しています。基本は「土づくり」です。堆肥を入れ、落ち葉をすきこんだり、いい土壌をつくっています。

今は、新高梨とあたご梨を主に栽培しています。成木、昨年植えた木を合わせて約350本あり、40年ぐらい前の木もあります。

―苦労するところ・楽しいことは

梨づくりは、楽しいです。11月の

下旬にはあたご梨の収穫が始まります。1年の成果が出ることを楽しみにしています。あたご梨は大きいもので1キログラム以上あり、甘みが強く、みずみずしく、上品な風味と独特な食感を楽しんでいたきたいです。

苦労したことは、昨年イノシシにやられました。収穫前の梨を取られたり、枝を折られたり、1日に100玉以上取られて大変でした。枝を折られると来年の成育に影響するので、今年は対策を徹底して大切な梨を守っています。

食べておいしい

―今後の抱負は

数年前から「あきづき」という品種をいれました。赤梨で新高梨より少し前に収穫できます。食べたときとてもおいしかったので作ろうと決めました。

自分が食べておいしいと思ったものを作って皆さまに食べてもらうことが一番です。

聞き手…JA岡山広報担当



雄神の梨をぜひ味わってください



1玉ずつ丁寧に包装してお届けします

自分が食べてみて、おいしいものを食べてもらいたい。

岡本 真典さん

雄神地区：梨農家

「おかもと まさのり」

昭和50年生まれ。㊤㊶雄神梨出荷組合組合長。妻・子・母の4人家族。

趣味は、子育て。



農
を担う
vol.292



栗の 黒酢酢豚

材料 (4人分)

豚バラ肉ブロック	200g
むき栗	8個
柿	1個
レンコン	100g
ブロッコリー	適宜
油	適宜
ごま油	小さじ1

作り方

- ①豚バラ肉は4等分にしてたっぷりのお湯で軟らかくなるまで下ゆです。むき栗は、塩を入れて水から下ゆです。ブロッコリーも下ゆです。レンコンは厚さ1cmのいちよう切りにする。柿は皮をむいて4等分にします。
- ②180度の油で①の豚バラ肉、むき栗、レンコンを素揚げする。
- ③フライパンに混ぜ合わせたたれの材料を火にかけ、とろみが付いたら②と柿を入れて絡め、ごま油を回し掛け、器に盛り付け、①のブロッコリーを飾って出来上がり。

レシピ ● 永井智一 次城県笠間市にある「天晴 (旧キッチン晴人)」オーナーシェフ

●たれ

砂糖	大さじ4
黒酢	大さじ3
しょうゆ	小さじ2
酒	小さじ2
レモン汁	大さじ1/2
ニンニクみじん切り	小さじ1/2
水	大さじ4
鶏がらスープのもと	小さじ1/2
水溶き片栗粉	大さじ1



職員旅行でリフレッシュ!!

今回のあぐろグラムでは、先日私が参加した職員旅行について紹介します。

JA岡山では職員相互の交流と親睦を深めることを目的に職員旅行が実施されています。今年は近くの倉敷から博多や東京など11コースあり、私は10月に総務課(広報担当)の弘末さんと一緒に大阪のユニバーサルスタジオジャパンに行ってきました。日帰りでしたが滞在時間は8時間あり、ショーを観たり、食事を楽しんだり、また、アトラクションの待ち時間では日常を忘れ色々な話をしたりと、とても有意義な一日となりました。

日常の業務や生活から離れ、職員同士で旅行にでかけてたくさんコミュニケーションを取ると、効率的に業務を進めることができ、良いアイデアが生まれたり、職員の成長にもつながるそうです。これをきっかけに、今よりもレベルアップできるようがんばります!

総務課長 佐藤 美苗



各種媒体で情報発信



オンラインショップ
はなやか
オンライン



Instagram



JAOKAYAMA.OFFICIAL



広報誌「はなやか」
意味

水彩画や油絵を描くときに絵具をまぜあわせて色をつくる板のこと。
特色ある地域の様々な情報をうまく調和させながら、地域と共に歩むという願いがこめられています。